

Ročník 2013

---



# SBÍRKA ZÁKONŮ

## ČESKÁ REPUBLIKA

---

Částka 149

Rozeslána dne 29. listopadu 2013

Cena Kč 40,-

---

### O B S A H:

377. Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv

---

**377****VYHLÁŠKA**

ze dne 25. listopadu 2013

**o skladování a způsobu používání hnojiv**

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 8 odst. 5 a § 9 odst. 9 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.:

**§ 1****Předmět úpravy**

Tato vyhláška zpracovává příslušný předpis Evropské unie<sup>1)</sup> a upravuje způsob

- a) skladování hnojiv a pomocných látek a kapacitu skladovacích prostor,
- b) používání hnojiv a pomocných látek na zemědělské půdě a lesních pozemcích,
- c) vedení evidence o použití hnojiv, pomocných látek a upravených kalů,
- d) hlášení o používání upravených kalů.

**§ 2****Skladování tuhých minerálních hnojiv**

(1) Tuhá minerální hnojiva se skladují ve skladech jako volně ložená nebo balená.

(2) Volně ložená minerální hnojiva se skladují

- a) v hromadách označených názvem hnojiva do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 1 m,
- b) v odděleních označených názvem hnojiva, kde hromady mohou dosahovat nejvýše po horní hranu přepážky, nebo
- c) v zásobnících.

(3) Balená minerální hnojiva se skladují pouze

v obalech k tomu určených. Do hmotnosti 50 kg se skladují v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m. Při uložení pytlů s hnojivou na paletách se palety mohou ukládat maximálně ve 2 vrstvách. Nad hmotnost 50 kg se hnojiva skladují ve velkoobjemových vacích jednotlivě nebo maximálně ve 2 vrstvách, pokud výrobce neuvádí jinak.

(4) Nejdéle 1 měsíc se mohou balená tuhá minerální hnojiva skladovat i na volných zpevněných plochách, přičemž se umístí na palety a ochrání před povětrnostními vlivy.

(5) Nejdéle 24 měsíců se může vápenaté hnojivo cukrovarská šáma uložit na zemědělské půdě.

(6) Nejdéle 2 měsíce se mohou hnojiva na bázi mletých vápenců dodávaná s vlhkostí 2 až 10 % uložit na zemědělské půdě.

**§ 3****Skladování jednosložkových hnojiv typu dusičnanu amonného**

(1) Jednosložkovými hnojivy typu dusičnanu amonného se pro účely této vyhlášky rozumějí hnojiva s celkovým obsahem obou forem dusíku, jak dusičnanového tak amonného, vyšším než 28 %.

(2) Hnojiva uvedená v odstavci 1 se mohou skladovat pouze

- a) ve skladech, odděleně a chráněna před jakýmkoli vnosem látek organického původu, zejména pilin, slámy, dřeva, oleje nebo látek alkalicky reagujících, zejména vápna a cementu,
- b) balená a v množství maximálně do 25 tun v jednom skladě,
- c) tak, aby byla chráněna proti přímému slunečnímu záření,
- d) minimálně ve vzdálenosti 1 m od zdi a stropu skladu a minimálně 0,5 m od tepelného a světelného zdroje a

<sup>1)</sup> Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů.

- e) za podmínky, že ve skladě rozsypané hnojivo a zbytky obalů jsou neprodleně odstraněny mimo skladovací prostor.

#### § 4

##### **Skladování kapalných minerálních hnojiv**

(1) Kapalná minerální hnojiva se skladují v nádržích k tomu účelu vybudovaných a označených názvem skladovaného hnojiva, umístěných v záchytných vanách o objemu větším, než je objem největší nádrže ve vaně umístěné.

(2) Suspenzní minerální hnojiva se skladují v nádržích opatřených účinným míchacím zařízením.

(3) Balená kapalná minerální hnojiva se skladují ve skladech.

(4) Nejdéle 1 měsíc se mohou balená kapalná minerální hnojiva skladovat i na volných zpevněných plochách, přičemž se ochrání před povětrnostními vlivy a maximální objem jednoho balení činí 1 000 litrů.

#### § 5

##### **Skladování organických a organominerálních hnojiv**

(1) Kapalná organická a organominerální hnojiva se skladují v nepropustných nadzemních, popřípadě částečně zapuštěných nádržích nebo v zemních jímkách. Při provozu jímek a nádrží se zamezí přítoku povrchových nebo srážkových vod do jímky nebo nádrže, pokud není v kolaudačním rozhodnutí nebo kolaudačním souhlasu uvedeno jinak.

(2) Volně ložená tuhá organická a organominerální hnojiva se skladují ve stavbách zabezpečených stejným způsobem jako stavby pro skladování tuhých statkových hnojiv s vyloučením přítoku povrchových nebo srážkových vod, jejichž součástí je sběrná jímka tekutého podílu, nebo způsobem uvedeným v § 2 odst. 2 ve skladech.

(3) Balená tuhá organická a organominerální hnojiva se skladují ve skladech způsobem uvedeným v § 2 odst. 3.

(4) Nejdéle 1 měsíc se mohou balená tuhá nebo kapalná organická a organominerální hnojiva skladovat i na volných zpevněných plochách, přičemž se umístí na palety a ochrání před povětrnostními vlivy.

(5) Tuhé organické hnojivo kompost může být před použitím uloženo na zemědělské půdě nejdéle 24 měsíců, na místech vhodných k jeho uložení, schválených v havarijním plánu<sup>2)</sup>.

#### § 6

##### **Skladování statkových hnojiv**

(1) Tuhá statková hnojiva se skladují ve stavbách pro skladování tuhých statkových hnojiv s vyloučením přítoku povrchových nebo srážkových vod. Součástí těchto staveb musí být sběrná jímka tekutého podílu. Kapacita skladovacích prostor pro tuhá statková hnojiva odpovídá jejich skutečné produkci za 6 měsíců. Toto neplatí při uložení tuhých statkových hnojiv na zemědělské půdě před jejich použitím. Na zemědělské půdě mohou být tuhá statková hnojiva uložena nejdéle 24 měsíců, na místech vhodných k jejich uložení, schválených v havarijním plánu.

(2) Tekutá statková hnojiva se skladují v nepropustných nádržích, jímkách nebo podroštových prostorech ve stájích. Jímky a nádrže, popřípadě podroštové prostory ve stájích odpovídají kapacitně minimálně čtyřměsíční předpokládané produkci kejdy nebo jejího tekutého podílu a minimálně tříměsíční předpokládané produkci močůvky a hnojůvky, a to v závislosti na klimatických a povětrnostních podmínkách regionu. Při provozu jímek a nádrží se zamezí přítoku povrchových nebo srážkových vod do jímky nebo nádrže, pokud není v kolaudačním rozhodnutí nebo kolaudačním souhlasu uvedeno jinak.

(3) Pokud nejsou k dispozici údaje o produkci statkových hnojiv, získané prokazatelným způsobem, zejména vážením, měřením objemu, výpočtem produkce statkových hnojiv podle druhu a kategorie zvířat, jejich hmotnosti, užitkovosti či způsobu krmení, s přihlédnutím ke spotřebě steliva, popřípadě k produkci odpadních vod, použijí se průměrné hodnoty produkce statkových hnojiv podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, tabulky A, a požadované skladovací kapacity se stanoví podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, tabulky B. Pokud nejsou k dispozici údaje o hmotnosti zvířat zjištěné vážením, použijí se pro přepočty na dobytčí jednotky údaje podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, tabulky C. V případě pastvy nebo pobytu hospodářských

<sup>2)</sup> § 2 písm. g) vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

zvířat na zemědělské půdě se potřeba skladovacích kapacit úměrně snižuje.

(4) Kapacity skladovacích prostor na statková hnojiva stanovené v odstavcích 1 až 3 mohou být sníženy v případě doložitelného uvedení statkových hnojiv do oběhu, jejich využití k výrobě organických hnojiv nebo k produkci bioplynu, popřípadě jejich likvidace jako odpadu, a to úměrně tomuto množství, na základě zpracovaného harmonogramu. Ani po tomto snížení však nesmí být skladovací kapacity menší, než je potřebné k uskladnění dvouměsíční celkové produkce statkových hnojiv.

## § 7

### Používání hnojiv, pomocných látek a substrátů

(1) Hnojiva, pomocné látky a substráty se používají v souladu s údaji uvedenými v jejich označení a při používání nesmí dojít k jejich přímému vniknutí do povrchových vod nebo na sousední pozemek.

(2) Pomocné půdní látky, které vznikají v zemědělské prvovýrobě jako technologické vody při chovu hospodářských zvířat a jednoduchém zpracování rostlinných produktů, obsahují maximálně 1 % sušiny a 0,1 % dusíku.

(3) Diferencované hnojení na základě údajů o vlastnostech půdy nebo stavu porostu splňuje podmínky rovnoměrného pokrytí pozemku podle § 9 odst. 2 písm. a) zákona o hnojivech. Podmínka rovnoměrného pokrytí pozemku je splněna i v případě hnojení podle nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu<sup>3)</sup> nebo podle nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor<sup>4)</sup>.

(4) Po aplikaci tekutých statkových hnojiv nebo kapalných organických hnojiv na povrch orné půdy se hnojiva zapracovávají do půdy nejpozději do 24 hodin, s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory a hnojení travních, jetelovinotravních a jetelovinových porostů v období nejméně 1 měsíce před sklizní. Po aplikaci tuhých statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv na povrch orné půdy se zapracovávají hnojiva do půdy nejpozději do 48 ho-

din; to neplatí pro vedlejší či hlavní produkty vzniklé při pěstování kulturních rostlin.

(5) Pro určování potřeby hnojiv se vychází

- a) z potřeby živin porostu pro předpokládaný výnos a kvalitu produkce,
- b) z množství přístupných živin v půdě a stanovištních podmínek (zejména vlivu klimatu, půdního druhu a typu),
- c) z půdní reakce (pH), poměru důležitých kationtů (vápníku, hořčíku a draslíku) a množství půdní organické hmoty (humusu) a
- d) z pěstitelských podmínek ovlivňujících přístupnost živin (předplodina, zpracování půdy, závlaha).

(6) Údaje o množství živin v půdě poskytuje agrochemické zkoušení půdy podle § 10 zákona o hnojivech. Chemickým rozbořem je stanovena půdní reakce (pH), obsah uhličitanů, potřeba vápnění, obsah přístupných živin (fosforu, draslíku, hořčíku, vápníku) a kationtová výměnná kapacita půdy.

## § 8

### Hnojení lesních pozemků

Hnojiva se používají podle

- a) vyhodnocení výsledků chemických rozborů půdy a porostů,
- b) vnějších příznaků poruch výživy, růstu a vývoje porostů a jejich celkového stavu,
- c) stanovištních podmínek a
- d) výsledků předchozího použití hnojiv v porostech.

## § 9

### Vedení evidence o použití hnojiv, pomocných látek a upravených kalů

(1) V evidenci se zaznamenávají údaje stanovené v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Pro určení přívodu živin se použijí hodnoty získané vlastním rozbořem ne starším než 1 rok, údaje z označení hnojiva nebo substrátu, případně údaje stanovené v příloze č. 3 k této vyhlášce, tabulce A. Pro vlastní odběry vzorků hnojiv a jejich rozboř se užijí

<sup>3)</sup> Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>4)</sup> Nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů.

postupy stanovené vyhláškou o odběrech a chemických rozbořech vzorků hnojiv<sup>5)</sup>). Pokud se použijí ke hnojení vedlejší či hlavní produkty vzniklé při pěstování kulturních rostlin, tedy skliditelné rostlinné zbytky, zejména sláma, chrást, plodina na zelené hnojení, tráva, zaznamenávají se do evidence bez uvedení množství hmoty a živin.

(3) Pro evidenci přívodu živin výkaly a močí hospodářských zvířat při pastvě nebo pobytu zvířat na zemědělské půdě se použijí údaje o produkci výkalů a moči a údaje o přívodu živin stanovené v příloze č. 3 k této vyhlášce, tabulce B. Datem použití statkového hnojiva je v tomto případě časové rozpětí pastvy nebo pobytu zvířat na zemědělské půdě.

(4) V položce druh statkového hnojiva se v případě zanechání výkalů a moči hospodářských zvířat na zemědělské půdě uvede označení „pastevní období“ nebo „pobyt“ s určením druhu nebo kategorie zvířat. Pokud nejsou k dispozici údaje o hmotnosti zvířat zjištěné vážením, použijí se pro přepočet na dobytčí jednotky údaje podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, tabulky C.

(5) Žadatelé o dotace na ošetřování travních porostů podle nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření<sup>6)</sup> použijí pro účely evidence přívodu živin výkaly a močí hospodářských zvířat při pastvě nebo pobytu zvířat na zemědělské půdě údaje stanovené v příloze č. 4 k této vyhlášce.

## § 10

### Způsob hlášení o používání upravených kalů

Vzor formuláře pro hlášení o používání upravených kalů je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.

## § 11

### Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.
2. Vyhláška č. 476/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.
3. Vyhláška č. 473/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 476/2000 Sb.
4. Vyhláška č. 399/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Vyhláška č. 91/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.
6. Vyhláška č. 353/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.

## § 12

### Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

<sup>5)</sup> Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozbořech vzorků hnojiv, ve znění vyhlášky č. 475/2000 Sb.

<sup>6)</sup> Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.

# Produkce statkových hnojiv, požadované skladovací kapacity a přepočít zviřat na dobyčtí jednotky

## A) Průměrná roční produkce statkových hnojiv a technologických vod<sup>1)</sup>, při průměrné spotřebě steliva, v přepočtu na jednu dobyčtí jednotku (1 DJ = 500 kg živé hmotnosti)

| Druh a kategorie zvířat       | Ustájení s produkci kejdy nebo drůbežního trusu |        |                                                                    |        | Ustájení s produkci hnoje, bez produkce močůvky |                    |                                 |                    | Ustájení s produkcí hnoje a močůvky |        |         |      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------|---------|------|
|                               | neředěná kejda, drůbeží trus                    |        | ředěná kejda <sup>2)</sup> , vč. technologických vod <sup>3)</sup> |        | hluboká podestýlka                              |                    | pravidelný odklíz chlívské mrvy |                    | technologické vody <sup>5)</sup>    |        | stelivo |      |
|                               | t/rok                                           | % suš. | t/rok                                                              | % suš. | stelivo                                         | hnůj <sup>4)</sup> | stelivo                         | hnůj <sup>4)</sup> | t/rok                               | kg/den | kg/den  | hnůj |
| Telata                        | 19,0                                            | 7,4    | 23,7                                                               | 5,9    | 7,9                                             | 13,3               | 6,0                             | 12,7               | 1,0                                 | 3,7    | 10,5    | 3,4  |
| Jalovice, býci                | 13,5                                            | 10,5   | 15,4                                                               | 9,2    | 8,5                                             | 11,8               | 6,0                             | 11,0               | 1,0                                 | 3,7    | 8,7     | 1,8  |
| Krávy dojené                  | 14,4                                            | 10,0   | 20,0                                                               | 7,2    | 8,5                                             | 12,4               | 6,0                             | 11,6               | 5,6                                 | 4,0    | 9,1     | 1,7  |
| Skot bez tržní produkce mléka |                                                 |        |                                                                    |        | 8,5                                             | 11,5               |                                 |                    |                                     |        |         |      |
| Předvýkrm prasat              | 21,0                                            | 6,5    | 29,0                                                               | 4,7    | 15,0                                            | 18,9               | 12,5                            | 18,1               | 5,0                                 | 10,0   | 13,5    | 5,3  |
| Výkrm prasat, prasníčky       | 12,0                                            | 8,0    | 16,0                                                               | 6,0    | 8,0                                             | 9,6                | 3,5                             | 8,2                | 4,0                                 | 3,1    | 6,0     | 4,8  |
| Prasnice                      | 10,0                                            | 6,9    | 15,0                                                               | 4,6    | 6,0                                             | 8,1                | 2,3                             | 7,0                | 4,5                                 | 2,0    | 4,1     | 4,7  |
| Ovce, kozy                    |                                                 |        |                                                                    |        | 7,0                                             | 7,8                | 5,5                             | 7,4                |                                     |        |         |      |
| Koně                          |                                                 |        |                                                                    |        | 6,0                                             | 7,2                | 3,0                             | 6,3                |                                     |        |         |      |
| Drůbež - čerstvý trus         | 9,4                                             | 28,0   |                                                                    |        |                                                 |                    |                                 |                    | 0,8                                 |        |         |      |
| - uleželý trus                | 6,3                                             | 32,0   |                                                                    |        |                                                 |                    |                                 |                    | 0,8                                 |        |         |      |
| - sušený trus                 | 2,8                                             | 73,0   |                                                                    |        |                                                 |                    |                                 |                    | 0,8                                 |        |         |      |
| - podestýlka                  |                                                 |        |                                                                    |        | 2,1                                             | 5,9                | 0,8                             | 5,5                | 0,8                                 |        |         |      |

<sup>1)</sup> Technologické vody vznikající v souvislosti s procesem dojení, při napájení zvířat a očištění stájí.

<sup>2)</sup> Při odlišném obsahu sušiny se produkce kejdy úměrně přepočte.

<sup>3)</sup> Technologické vody z dojírny, mléčnice a přílehlých prostor (roční produkce 4,2 - 5,6 t/DJ, tj. 15 - 20 litrů na krávu a den) mohou být skladovány samostatně.

Technologické vody vznikající při očištění stájí a při napájení zvířat (roční produkce 0 - 1,4 t/DJ, tj. 0 - 5 litrů na krávu a den) jsou skladovány společně s kejdou.

<sup>4)</sup> Při odlišné spotřebě steliva se produkce hnoje úměrně přepočte (1 kg steliva na 1 DJ za den = 0,3 t hnoje na 1 DJ za rok).

<sup>5)</sup> Technologické vody s obsahem 1 % sušiny a 0,9 kg dusíku na tunu (N/t).

<sup>6)</sup> Močůvku tvoří volná moč, která se nezasáká do steliva a technologické vody.

**B) Požadované minimální skladovací kapacity pro průměrnou produkci statkových hnojiv<sup>1)</sup>, v přepočtu na jednu dobytčí jednotku (1 DJ = 500 kg živé hmotnosti)**

| Druh a kategorie zvířat | Objem skladu na čtyřměsíční produkci kejdy (m <sup>3</sup> ) |                            | Objem skladu na šestiměsíční produkci drůbežního trusu a hnoje, včetně hnoje z drůbeží podestýlky (m <sup>3</sup> ) |                                         |                                                            |                                    | Plocha skladu na šestiměsíční produkci drůbežního trusu a hnoje, včetně hnoje z drůbeží podestýlky, při vrstvě 2 m (m <sup>2</sup> ) |                                         |                                                            |                                    | Objem skladu na tříměsíční produkci močůvky |         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
|                         | neředěná kejda <sup>2)</sup>                                 | ředěná kejda <sup>2)</sup> | drůbeží trus                                                                                                        | hnůj <sup>3)</sup> z hluboké podestýlky | hnůj <sup>3)</sup> , při pravidelném odkluzu chlévské mrvy | hnůj z ustájení s produkci močůvky | drůbeží trus                                                                                                                         | hnůj <sup>3)</sup> z hluboké podestýlky | hnůj <sup>3)</sup> , při pravidelném odkluzu chlévské mrvy | hnůj z ustájení s produkci močůvky | volná moč                                   | močůvka |
| Telata                  | 6,1                                                          | 7,7                        |                                                                                                                     | 7,8                                     | 7,4                                                        | 6,2                                |                                                                                                                                      | 3,9                                     | 3,7                                                        | 3,1                                | 0,9                                         | 1,5     |
| Jalovice, býci          | 4,4                                                          | 5,0                        |                                                                                                                     | 7,0                                     | 6,4                                                        | 5,2                                |                                                                                                                                      | 3,5                                     | 3,2                                                        | 2,6                                | 0,5                                         | 1,5     |
| Krávy dojené            | 4,7                                                          | 6,5                        |                                                                                                                     | 7,2                                     | 6,8                                                        | 5,4                                |                                                                                                                                      | 3,6                                     | 3,4                                                        | 2,7                                | 0,4                                         | 1,8     |
| Předvýkrm prasat        | 6,8                                                          | 9,4                        |                                                                                                                     | 11,2                                    | 10,6                                                       | 8,0                                |                                                                                                                                      | 5,6                                     | 5,3                                                        | 4,0                                | 1,3                                         | 2,5     |
| Výkrm prasat, prasníčky | 3,9                                                          | 5,2                        |                                                                                                                     | 5,6                                     | 4,8                                                        | 3,6                                |                                                                                                                                      | 2,8                                     | 2,4                                                        | 1,8                                | 1,2                                         | 2,2     |
| Prasnice                | 3,2                                                          | 4,9                        |                                                                                                                     | 4,8                                     | 4,2                                                        | 2,4                                |                                                                                                                                      | 2,4                                     | 2,1                                                        | 1,2                                | 1,2                                         | 2,1     |
| Ovce, kozy              |                                                              |                            |                                                                                                                     | 4,6                                     | 4,4                                                        |                                    |                                                                                                                                      | 2,3                                     | 2,2                                                        |                                    |                                             |         |
| Koně                    |                                                              |                            |                                                                                                                     | 4,2                                     | 3,8                                                        |                                    |                                                                                                                                      | 2,1                                     | 1,9                                                        |                                    |                                             |         |
| Drůbež                  |                                                              |                            | 2,4                                                                                                                 | 3,4                                     | 3,2                                                        |                                    | 1,2                                                                                                                                  | 1,7                                     | 1,6                                                        |                                    |                                             |         |

<sup>1)</sup> Při měrných hmotnostech kejdy 1,03 t/m<sup>3</sup>, hnoje 0,85 t/m<sup>3</sup> a močůvky 1,00 t/m<sup>3</sup>.

<sup>2)</sup> Při odlišném obsahu sušiny v kejdě, než je uvedeno v příloze č. 1, tabulce A, se produkce hnoje a požadovaná skladovací kapacita úměrně přepočte.

<sup>3)</sup> Při odlišné spotřebě steliva, než je uvedeno v příloze č. 1, tabulce A, se produkce hnoje a požadovaná skladovací kapacita úměrně přepočte.

**C) Přepočet zvířat na dobytčí jednotky<sup>1)</sup> (1 DJ = 500 kg živé hmotnosti)**

| Druh a kategorie zvířat           | Věk                       | Průměrná hmotnost (kg/kus) | Koeficient přepočtu (DJ/kus) |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Skot</b>                       |                           |                            |                              |
| Telata                            | do 6 měsíců               | 115                        | 0,23                         |
| Jalovice                          | nad 6 měsíců až do 1 roku | 265                        | 0,53                         |
| Jalovice                          | nad 1 rok až do 2 let     | 470                        | 0,94                         |
| Jalovice                          | nad 2 roky                | 600                        | 1,20                         |
| Krávy, bez ohledu na užitkový typ |                           | 650                        | 1,30                         |
| Býci                              | nad 6 měsíců až do 1 roku | 300                        | 0,60                         |
| Býci                              | nad 1 rok až do 2 let     | 560                        | 1,12                         |
| Býci, vč. volů                    | nad 2 roky                | 800                        | 1,60                         |
| <b>Prasata</b>                    |                           |                            |                              |
| Předvýkrm                         |                           | 20                         | 0,04                         |
| Výkrm, prasničky (do zapuštění)   |                           | 70                         | 0,14                         |
| Prasničky (od zapuštění)          |                           | 160                        | 0,32                         |
| Prasnice                          |                           | 235                        | 0,47                         |
| Prasata divoká                    |                           | 75                         | 0,15                         |
| <b>Ovce, kozy, mufloni</b>        |                           |                            |                              |
| Ovce, kozy <sup>2)</sup>          | nad 1 rok                 | 70                         | 0,20                         |
| Mufloni                           |                           | 35                         | 0,07                         |
| <b>Koně<sup>3)</sup></b>          |                           |                            |                              |
| Hříbata                           | do 6 měsíců               | 200                        | 0,40                         |
| Koně                              | nad 6 měsíců až do 1 roku | 350                        | 0,70                         |
| Koně                              | nad 1 rok až do 3 let     | 500                        | 1,00                         |
| Koně                              | nad 3 roky                | 650                        | 1,30                         |
| <b>Jelenovití</b>                 |                           |                            |                              |
| Srnci                             |                           | 20                         | 0,04                         |
| Daňci                             |                           | 50                         | 0,10                         |
| Jeleni                            |                           | 110                        | 0,22                         |
| <b>Drůbež</b>                     |                           |                            |                              |
| Nosnice                           |                           | 1,7                        | 0,0034                       |
| Kuřice                            |                           | 0,8                        | 0,0016                       |
| Brojleři                          |                           | 1,0                        | 0,0020                       |
| Kachny chov                       |                           | 3,5                        | 0,0070                       |
| Kachny výkrm                      |                           | 2,0                        | 0,0040                       |
| Husy chov                         |                           | 4,8                        | 0,0096                       |
| Husy výkrm                        |                           | 2,5                        | 0,0050                       |
| Krůty chov                        |                           | 10,0                       | 0,0200                       |
| Krůty výkrm                       |                           | 5,0                        | 0,0100                       |
| Krocani chov                      |                           | 20,0                       | 0,0400                       |
| Krocani výkrm                     |                           | 10,0                       | 0,0200                       |

<sup>1)</sup> Pokud jsou k dispozici údaje o hmotnosti zvířat zjištěné vážením, použijí se pro přepočet na dobytčí jednotky, za účelem výpočtu produkce statkových hnojiv, tyto zjištěné hodnoty.

<sup>2)</sup> Do koeficientu přepočtu na dobytčí jednotky jsou započtena i jehňata a kůzlata. Při odlišné průměrné hmotnosti dospělých ovcí a koz, než je uvedeno, se pro účely výpočtu produkce statkových hnojiv koeficient úměrně upraví.

<sup>3)</sup> Pro poníky a jiná malá plemena koní se pro účely výpočtu produkce statkových hnojiv použije koeficient přepočtu na dobytčí jednotky v poloviční hodnotě.

Evidence o použití hnojiv, statkových hnojiv, pomocných látek a upravených kalů

podnikatel v zemědělství:  
vlastník lesního pozemku:  
fyzická nebo právnická osoba provozující lesní výrobu:

datum narození (IČ, bylo-li přiděleno):  
IČ, bylo-li přiděleno:

| Katastrální území <sup>1)</sup> | Pozemek <sup>1)</sup><br>Lesní pozemek<br>(oddělení, porost, porostní skupina) |             | Plodina <sup>2)</sup>        |             | Hnojení           |   |             | Hnojiva, statková hnojiva, upravené kaaly (v sušině) |                       |                             |                               |                  |     |     | Pomocné látky, hnojiva se stopovými živinami |       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------------|---|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|-----|-----|----------------------------------------------|-------|
|                                 | číslo                                                                          | plocha (ha) | druh, odrůda (užitkový směr) | plocha (ha) | datum             |   | plocha (ha) | druh nebo název                                      | celkem (t, kg, litry) | dávka (t, kg, litr na 1 ha) | přívod živin (kg/ha)          |                  |     |     |                                              | název |
|                                 |                                                                                |             |                              | použití     | zapravení do půdy | N |             |                                                      |                       |                             | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | K <sub>2</sub> O | MgO | CaO | S                                            |       |
|                                 |                                                                                |             |                              |             |                   |   |             |                                                      |                       |                             |                               |                  |     |     |                                              |       |

<sup>1)</sup> Pokud je podnikatel v zemědělství zařazen v registru půdy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, uvede v rubrice katastrální území číslo čtverce mapy a v rubrice pozemek zkrácený kód půdního bloku nebo jeho dílu.

<sup>2)</sup> U trvalých travních porostů se uvede pouze zemědělská kultura travní porost.

**Průměrný přívod živin ve hnojivech a průměrná roční produkce dusíku zvířaty****A) Průměrný přívod živin<sup>1)</sup> ve statkových a organických hnojivech**

| Hnojiva                                   |                                     | Průměrný obsah sušiny | Průměrný přívod živin |                               |                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|
|                                           |                                     |                       | N                     | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | K <sub>2</sub> O |
|                                           |                                     |                       |                       | %                             | kg/t             |
| Statková hnojiva                          |                                     |                       |                       |                               |                  |
| Hněj skotu                                | telata, jalovice, býci              | 22                    | 6,5                   | 4,0                           | 7,6              |
|                                           | krávy dojené                        | 22                    | 6,9                   | 4,0                           | 7,6              |
|                                           | skot bez tržní produkce mléka       | 22                    | 5,6                   | 2,1                           | 5,7              |
| Močůvka skotu a hnojůvka                  |                                     | 1,3                   | 1,5                   | 0,2                           | 2,1              |
| Hněj prasat                               | předvýkrm                           | 24                    | 5,5                   | 8,8                           | 7,0              |
|                                           | výkrm, prasničky, prasnice          | 24                    | 8,5                   | 8,8                           | 7,0              |
| Močůvka prasat a hnojůvka                 |                                     | 1,2                   | 2,2                   | 0,5                           | 2,1              |
| Hněj koňský                               |                                     | 30                    | 5,2                   | 3,5                           | 8,7              |
| Hněj ovcí a koz                           |                                     | 32                    | 8,9                   | 5,4                           | 17,7             |
| Kejda skotu                               | telata                              | 5,9                   | 3,7                   | 1,5                           | 3,0              |
|                                           | jalovice, býci                      | 9,2                   | 3,9                   | 1,9                           | 3,8              |
|                                           | krávy dojené                        | 7,2                   | 3,8                   | 1,6                           | 3,1              |
|                                           | směs kejdy od více kategorií skotu  | 7,3                   | 3,9                   | 1,6                           | 3,1              |
|                                           | tekutá část po separaci (fugát)     | 5,8                   | 3,9                   | 1,6                           | 3,2              |
|                                           | tuhá část po separaci (separát)     | 21                    | 4,2                   | 1,7                           | 2,5              |
| Kejda prasat                              | předvýkrm                           | 4,7                   | 3,1                   | 2,5                           | 2,0              |
|                                           | výkrm, prasničky                    | 6,0                   | 4,8                   | 3,1                           | 2,6              |
|                                           | prasnice                            | 4,6                   | 4,0                   | 2,4                           | 1,5              |
|                                           | směs kejdy od více kategorií prasat | 5,3                   | 4,3                   | 3,0                           | 2,1              |
|                                           | tekutá část po separaci (fugát)     | 3,4                   | 4,1                   | 2,4                           | 2,0              |
|                                           | tuhá část po separaci (separát)     | 27                    | 6,6                   | 9,7                           | 2,9              |
| Drůbeží trus                              | čerstvý                             | 28                    | 18,5                  | 12,8                          | 8,9              |
|                                           | uleželý                             | 32                    | 19,0                  | 14,6                          | 10,2             |
|                                           | sušený                              | 73                    | 35,0                  | 33,3                          | 23,2             |
|                                           | s podestýlkou                       | 42                    | 20,4                  | 18,8                          | 15,2             |
| Hněj králíků                              |                                     | 29                    | 7,9                   | 6,2                           | 10,4             |
| Kejda králíků                             |                                     | 18                    | 4,1                   | 4,1                           | 4,2              |
| Silážní šťávy ředěné                      |                                     | 2,1                   | 1,3                   | 0,7                           | 2,5              |
| Organická hnojiva                         |                                     |                       |                       |                               |                  |
| Kompost ze statkových hnojiv              |                                     | 40                    | 5,5                   | 4,5                           | 6,1              |
| Digestát ze zemědělské bioplynové stanice |                                     | 5,8                   | 5,3                   | 1,6                           | 3,5              |
| Tekutá část po separaci digestátu (fugát) |                                     | 3,9                   | 5,1                   | 1,4                           | 3,4              |
| Tuhá část po separaci digestátu (separát) |                                     | 23                    | 6,8                   | 3,0                           | 4,5              |

<sup>1)</sup> Přívod živin ve statkových hnojivech je uveden k termínu jejich použití, tedy po odpočtu ztrát živin ve stájích a při skladování statkových hnojiv. Při odlišném obsahu sušiny u tekutých statkových hnojiv se obsah živin úměrně přepočte. Pokud je k dispozici rozbor obsahu živin, použijí se hodnoty tohoto rozboru.

**Poznámka:**

Analýzy na obsahy dusíku, fosforu a draslíku v upravených kalech (v sušině) i v půdách pozemků, kde budou aplikovány, zajišťují původci kalu podle vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě (obsah P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> = obsah P x 2,292; obsah K<sub>2</sub>O = obsah K x 1,204).

**B) Průměrná roční produkce výkalů a moči, v přepočtu na jednu dobytčí jednotku (1 DJ = 500 kg živé hmotnosti) a průměrný přívod celkového dusíku a dalších živin při pastvě zvířat nebo jejich jiném pobytu na zemědělské půdě**

| Druh zvířat    | Výkaly a moč | Průměrný přívod živin   |                               |                  |
|----------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|
|                |              | celkový N <sup>1)</sup> | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | K <sub>2</sub> O |
|                | t/rok        | kg/t výkalů a moči      |                               |                  |
| Skot           | 14,0         | 4,9                     | 2,1                           | 4,2              |
| Ovce a kozy    | 9,1          | 8,2                     | 2,6                           | 6,6              |
| Koně           | 8,6          | 4,7                     | 2,3                           | 3,5              |
| Mufloni        | 11,8         | 4,9                     | 2,6                           | 6,6              |
| Jelenovití     | 12,3         | 2,9                     | 2,7                           | 7,5              |
| Prasata divoká | 12,5         | 5,0                     | 3,0                           | 2,3              |

<sup>1)</sup> Přívod živin ve výkalech a moči hospodářských zvířat při pastvě nebo jiném pobytu na zemědělské půdě se rovná produkci živin. Ztráty dusíku nejsou odečteny. Zde uvedené hodnoty se použijí pro výpočet produkce výkalů a moči a přívodu živin pro všechny věkové kategorie zvířat.

**C) Průměrná roční produkce dusíku ve výkalech, moči a drůbežím trusu, v přepočtu na jednu dobytčí jednotku (1 DJ = 500 kg živé hmotnosti)**

| Druh a kategorie zvířat       | Produkce dusíku ve výkalech, moči a čerstvém drůbežím trusu | Produkce dusíku po odpočtu ztrát ve stájích a při skladování statkových hnojiv <sup>1)</sup> |                           |                                             |                |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------|
|                               |                                                             | Kejda, drůbeží trus                                                                          | Hnůj z hluboké podestýlky | Hnůj, při pravidelném odklizu chlévské mrvy | Hnůj a močůvka |
|                               |                                                             | kg N/DJ za rok                                                                               |                           |                                             |                |
| Skot                          |                                                             |                                                                                              |                           |                                             |                |
| Telata                        | 90                                                          | 88                                                                                           | 86                        | 83                                          | 77             |
| Jalovice, býci                | 69                                                          | 60                                                                                           | 77                        | 72                                          | 66             |
| Krávy dojené                  | 84                                                          | 76                                                                                           | 91                        | 85                                          | 74             |
| Skot bez tržní produkce mléka | 69                                                          |                                                                                              | 64                        |                                             |                |
| Prasata                       |                                                             |                                                                                              |                           |                                             |                |
| Předvýkrm                     | 110                                                         | 90                                                                                           | 108                       | 104                                         | 96             |
| Výkrm, prasničky              | 95                                                          | 77                                                                                           | 85                        | 73                                          | 71             |
| Prasnice                      | 75                                                          | 60                                                                                           | 73                        | 64                                          | 54             |
| Prasata divoká                | 63                                                          |                                                                                              |                           |                                             |                |
| Ovce, kozy, mufloni           |                                                             |                                                                                              |                           |                                             |                |
| Ovce, kozy                    | 75                                                          |                                                                                              | 69                        | 65                                          |                |
| Mufloni                       | 58                                                          |                                                                                              |                           |                                             |                |
| Koně                          |                                                             |                                                                                              |                           |                                             |                |
| Koně                          | 40                                                          |                                                                                              | 37                        | 33                                          |                |
| Jelenovití                    |                                                             |                                                                                              |                           |                                             |                |
| Jeleni, daňci, srnci          | 36                                                          |                                                                                              |                           |                                             |                |
| Drůbež                        |                                                             |                                                                                              |                           |                                             |                |
| - čerstvý trus                | 175                                                         |                                                                                              |                           |                                             |                |
| - uleželý trus                | 175                                                         | 120                                                                                          |                           |                                             |                |
| - sušený trus                 | 175                                                         | 99                                                                                           |                           |                                             |                |
| - trus s podestýlkou          | 175                                                         |                                                                                              | 121                       | 113                                         |                |

<sup>1)</sup> Ve hnoji jsou navíc obsaženy i živiny dodané ve stelivu (průměrný obsah dusíku v 1 t obilní slámy je 5 kg N).

V hodnotě produkce dusíku je započítán i dusík obsažený v technologických vodách, skladovaných samostatně.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 377/2013 Sb.

**Průměrná roční produkce výkalů a moči, v přepočtu na jednu dobytčí jednotku (1 DJ = 500 kg živé hmotnosti) a průměrný přívod účinného dusíku a dalších živin při pastvě zvířat nebo jejich jiném pobytu na zemědělské půdě**

| Druh zvířat    | Výkaly a moč | Průměrný přívod živin  |                               |                  |
|----------------|--------------|------------------------|-------------------------------|------------------|
|                |              | účinný N <sup>1)</sup> | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | K <sub>2</sub> O |
|                | t/rok        | kg/t výkalů a moči     |                               |                  |
| Skot           | 14,0         | 3,0                    | 2,1                           | 4,2              |
| Ovce a kozy    | 9,1          | 4,9                    | 2,6                           | 6,6              |
| Koně           | 8,6          | 2,8                    | 2,3                           | 3,5              |
| Mufloni        | 11,8         | 2,9                    | 2,6                           | 6,6              |
| Jelenovití     | 12,3         | 1,8                    | 2,7                           | 7,5              |
| Prasata divoká | 12,5         | 3,0                    | 3,0                           | 2,3              |

<sup>1)</sup>V tabulce je uveden přívod dusíku do půdy po odpočtu ztrát do ovzduší a při zohlednění jeho účinnosti v roce pastvy. Tyto údaje použijí v evidenci hnojení za celý podnik, namísto údajů stanovených v příloze 3, tabulce B, žadatelé o dotace na ošetřování travních porostů podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření. Zde uvedené hodnoty se použijí pro výpočet produkce výkalů a moči a přívodu živin pro všechny věkové kategorie zvířat.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 377/2013 Sb.

**Hlášení o používání upravených kalů**

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Zemědělský podnikatel                     |  |
| Místo podnikání nebo sídlo                |  |
| Datum narození nebo IČ, bylo-li přiděleno |  |
| Termín použití (od – do)                  |  |
| Původce upravených kalů                   |  |

Datum, razítko, podpis:





**Vydává a tiskne:** Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175, e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2013 činí 6 000,- Kč, druhá záloha na rok 2013 činí 6 000,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky-knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. **Internetová prodejna:** www.sbirkyzakonu.cz – **Drobný prodej – Brno:** Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; **České Budějovice:** SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; **Chab: EFREX, s. r. o.,** Karlova 31; **Chomutov:** DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň:** Knihařství – Příbicková, J. Švermy 14; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Olomouc:** Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; **Ostrava:** LIBREX, Nádražní 14; **Otrokovice:** Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; **Pardubice:** ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEK, s. r. o., třída Míru 65; **Plzeň:** Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; **Praha 3:** Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; **Praha 4:** Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; **Praha 6:** PERIODIKA, Komornická 6; **Praha 9:** Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; **Praha 10:** BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; **Přerov:** Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; **Ústí nad Labem:** PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029; **Zábřeh:** Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; **Zátec:** Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevídování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamace:** informace na tel. číslo 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnícká osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.